

Un caso di sinonimia in ostracodi marini quaternari

Giuliano RUGGIERI

Istituto di Geologia della Università
Corso Tuköry, 131 - 90134 Palermo

(manoscritto ricevuto il 15 gennaio 1977)

Ciampo (1976) e Ruggieri (1976) hanno pubblicato ciascuno una nota concernente ostracodi marini del Pleistocene inferiore sul fasc. 1, vol. 15, di questo bollettino. Il caso ha voluto che la stessa specie sia stata descritta come nuova rispettivamente da Ciampo (1976, p. 8, Tav. 2, fig. 1-5; Tav. 7, fig. 3) come *Callistocythere praecincta*, e da Ruggieri (1976, p. 96, fig. 7 n. testo) come *Leptocythere kellethae*. Nonostante la diversa attribuzione generica, si tratta certamente della stessa specie, come ho accertato dal confronto di diversi paratipi del Dr. Ciampo. Le piccole differenze che risultano dalle illustrazioni o dipendono dalla variabilità individuale, o sono apparenti, in funzione del tipo diverso di deformazione prospettica che si realizza nelle riproduzioni allo S.E.M. e nei disegni al microscopio da biologia.

La diversa attribuzione generica è dovuta al fatto che fra *Leptocythere* Sars e *Callistocythere* Ruggieri vi è un certo numero di specie con caratteristiche intermedie, quale appunto la specie di discorso. La

attribuzione a *Callistocythere* mi appare ora più giustificata.

In conclusione il nome da attribuire alla specie è *Callistocythere praecincta* Ciampo, 1976, che ha la priorità. Sinonimi: *Leptocythere kellethae* Ruggieri, 1976, e *L. aff. rastrifera* secondo Uffenorde (1972, p. 65, Tav. 6, figg. 8, 11).

BIBLIOGRAFIA

- CIAMPO, G., 1976, Ostracodi pleistocenici di Casa Bianca (Marina di Camerota - Salerno): Boll. Soc. Paleont. Ital., vol. 15, n. 1, pp. 3-23, 7 tavv.
RUGGIERI, G., 1976, La Ostracofauna pleistocenica della falesia di Cinisi: Boll. Soc. Paleont. Ital., vol. 15, n. 1, pp. 85-106.
UFFENORDE, H., 1972, Oekologie und jahreszeitliche Verteilung rezenten bentonischer Ostracoden des Limski Kanal bei Rovinj (nördliche Adria): Göttinger Arb. Geol. Paläont., vol. 13, 121 ps., 12 pls.

